

BULETIN DE AVERTIZARE

NR.1 din 27.02.2026

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare in spatii protejate, sere, solarii.

Se recomanda efectuarea tratamentelor in spatii protejate, sere, solarii :

Pentru producerea unor rasaduri sanatoase se impune realizarea unor lucrari premergatoare cum ar fi :

1. Dezinfectia solului si a substratului de cultura destinat culturilor de legume timpurii (in spatii inchise)
2. Dezinfectia amestecului de pamant necesar producerii de rasaduri.

1. Dezinfectia solului, amestecului de pamant din sere si solarii pentru combaterea bacteriilor si ciupercilor de sol, a insectelor, nematozilor si a semintelor de buruieni se poate realiza cu:

1. **NEMASOL 510** - fumigant de sol cu actiune nematocida, fungicida, erbicida, insecticida 700-1000 l/ha. (0,7 - 0,1 l/mp.) aplicat prin irigare, cu cel putin 21 zile inainte de plantare.

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr. Trat.
Ardei (sera)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700-1200 L/ha se aplica inainte de plantarea rasadurilor	-	-
Capsun (camp)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	300 L/ha se aplica inainte de plantarea rasadurilor	-	-
Capsun (in sera)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700-1200 L/ha se aplica inainte de plantarea rasadurilor	-	-
Cartof (camp)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	300 L/ha se aplica inainte de plantat	-	-
Castraveti (sera)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700 L/ha se aplica inainte de plantarea rasadurilor	-	-
Morcov (camp)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	300 L/ha se aplica inainte de semanat	-	-
Morcov (sera)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700-1200 L/ha se aplica inainte de semanat	-	-
tomate (sera)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700 L/ha se aplica inainte de plantarea rasadurilor	-	-
Vinete (sere)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700-1200 L/ha se aplica inainte de plantarea rasadurilor	-	-

2. **BASAMID GRANULE** - sterilizant de sol cu actiune nematocida, fungicida, erbicida, insecticida 500 kg/ha. (0,05 kg/mp). Aplicarea granulelor prin incorporare inainte de plantare, pe sol umed).

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Legume din solarii înfiintate prin rasad	Dăunători	Coropisnita	250 kg/ha	-	-
Tomate sera	Boli	Mana de sol, fuzarioza, ofilirea vasculara	500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de p	-	-
Tomate sera	Dăunători	Nematodul galicol al radacinilor	500 kg/ha - se administreaza la sol cu incorporare, inainte de pl	-	-

3. **VELUM PRIME 400 SC:** utilizare in sere/ spatii protejate, pentru combaterea nematozilor si a fainarii prin aplicare la sol odata cu apa de irigat - 625 ml/ha in 2000-6000 l apa; se vor efectua 2 tratamente per ciclu de productie si pe an la un interval de 15 - 30 zile intre tratamentele succesive. Doza maxima este de 1250 ml/ha/an. Primul tratament se recomanda a se efectua cu 1-3 zile inainte de plantarea rasadului, urmat de al doilea tratament la 15 - 30 zile dupa finalizarea transplantarii. Velum Prime 400SC trebuie aplicat pe un teren udat anterior pentru a favoriza activare produsului in plante

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Meloidogyne sp. (Nematozi), Leveillula taurica (Fainare)	625mL/ha	-	-
Ardei, tomate, vinete	Dăunători	Meloidogyne sp. (Nematozi)	625mL/ha	-	-
Cartof	Dăunători	Meloidogyne spp., Globodera pallida, Globodera rostochiensis (Nematozi)	625mL/ha	-	-
Castraveti (spatii protejate)	Dăunători	Meloidogyne sp. (Nematozi), Sphaeroteca fulginea(Fainare)	625mL/ha	-	-
Dovleac	Boli	Meloidogyne sp. (Nematozi), Erysiphe spp(Fainare)	625mL/ha	-	-
Dovlecei (spatii protejate)	Dăunători	Meloidogyne sp. (Nematozi), Sphaeroteca fulginea(Fainare)	625mL/ha	-	-
morcov	Dăunători	Meloidogyne spp., Heterodera carotae, Pratylenchus spp., Trichodorus spp. (Nematozi)	625mL/ha	-	-
Pepeni galbeni (spatii protejate)	Dăunători	Meloidogyne sp. (Nematozi), Sphaeroteca fulginea(Fainare)	625mL/ha	-	-
Pepeni verzi (Sere si solarii)	Dăunători	Meloidogyne sp. (Nematozi), Sphaeroteca fulginea(Fainare)	625mL/ha	-	-
pepeni verzi, pepeni galbeni	Dăunători	Meloidogyne sp. (Nematozi), Erysiphe sp. (Fainare)	625mL/ha	-	-
tomate sera si solarii	Dăunători	Meloidogyne sp. (Nematozi), Leveillula taurica (Fainare)	625 mL/ha	-	-
Vinete (spatii protejate)	Dăunători	Meloidogyne sp. (Nematozi), Leveillula taurica (Fainare)	625mL/ha	-	-

In vegetatie nematozii galicoli ai legumelor se combat cu :

NEMATHORIN 10 G (nematozii si viermii sarma din sere si solarii). Doza : 15,0 kg/ha, aplicat pe rand cu incorporare la 8-10 cm. adancime. Este bine ca solul tratat sa fie acoperit cu o folie de plastic pe o perioada de timp si care va fi ridicata cu o saptamana inainte de semanat.

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Cartof	Dăunători	Nematozii comuni, viermii sarma	10-15 kg/ha	120 zile	1 tratament la 3
Cartof pentru samanta	Dăunători	Nematozii cu chisti	30 kg/ha	-	1 tratament la 3
Castraveti sera si solar	Dăunători	Nematodul galicol al radacinilor	15 kg/ha	70 zile	-
tomate sera si solarii	Dăunători	Nematodul galicol al radacinilor	15 kg/ha	70 zile	-

Dezinfectia amestecului de pamant - necesar producerii de rasaduri sau repicatului se

recomanda in cazul realizarii patului de amestec de pamant din gospodaria proprie-pamant de telina, pamant de frunze, mranita si se face termic prin caldura umeda sau uscata(14 zile timp de pauza si/sau chimic cu unul din produsele:

1. PREVICUR ENERGY - 3,0 l/ha, aplicat prin picurare

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr. Trat.
Castraveti (spatii protejate)	Boli	Mana, caderea plantutelor	3 mL/m ² tratament aplicat la sol	3 zile	-
Castraveti (spatii protejate)	Boli	Mana, caderea plantutelor	3 L/ha tratament aplicat prin picurare	3 zile	-
Pepene verde (spatii protejate)	Boli	Mana, caderea plantutelor	3 L/ha tratament aplicat prin picurare	3 zile	-
Pepene verde (spatii protejate)	Boli	Mana, caderea plantutelor	3 mL/m ² tratament aplicat la sol	3 zile	-
Tomate spatii protejate	Boli	Mana, caderea plantutelor	3 L/ha tratament aplicat prin picurare	3 zile	-
Tomate spatii protejate	Boli	Mana, caderea plantutelor	3 mL/m ² tratament aplicat la sol	3 zile	-

2. MERPAN 80 WDG / FLO CAPTAN - 0,15% (4-5 l sol./mp)

Tomate (rasad)	Boli	caderea plantutelor, mana de sol, putregaiul radacinilor	0,15 % (4-5 l sol./mp)	-	-
----------------	------	--	------------------------	---	---

Dezinfectia uneltelor, tocurilor de rasadnita, aleilor cu solutii pe baza de cupru + tiofana metil.

Alte recomandari:

Luati masurile necesare ce se impun pentru protectia mediului incojurator. Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de prptectia plantelor, pe cele de securitate a muncii si cele de protectie a albinelor si animalelor.

Se vor respecta prevederile OG 4/1995 modificata si aprobata prin Legea 85/1995 precum si OG 41/2007 modificata si aprobata prin L28/2009.

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate.

Respectați timpul de pauză a fiecarui produs.

Citiți cu atenție prospectul/instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !

Folosiți la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;

Clatiți de 3 ori recipientii si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > **program SCAPA** www.aiprom.r Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !

Pentru protecția albinelor este obligatorie respectarea Ordinului privind masurile pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei :1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor ; 65/05.02.1992 al Ministerului Mediului ; 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Legea apiculturii 393/2013, Protocolul de colaborare nr.328.432/31.03.2015 incheiat intre Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania, Protocolul nr.3242/21.10.2016 dintre Autoritatea Nationala Fitosanitara si Federatia Asociatiilor Apicole3 din Romania - Romapis, privind implementarea legislatiei in vederea protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu produse de protectia plantelor.

Întocmit;

Cons.superior , Cretu Iuliana

Tratamentele fitosanitare efectuate se inregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.2.

ANEXA la Buletinul de prognoza si avertizare

Nume și prenume fermier/soc. comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății
(Comuna, județul)
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRU

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Tim-pul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, pre-numele pers. responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: bola/dăunătorul/buruieni	Denu-mire ppp folosit	Doza omolo-gată /doza folosită	Supra-fața, ha	Canti-tăți utili-zate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează” (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

Respectați normele de ecocondiționalitate prevăzute în Ordinul MADR nr.352 din 10 februarie 2015, conform căruia orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin trebuie să respecte cerințele cu privire la utilizarea produselor de protecția plantelor (SMR 10)

Respectați cu strictete condițiile de depozitare, de manipulare și utilizare a produselor de protecția plantelor în exploatarea agricole, așa cum sunt prevăzute în Ghidul pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecția plantelor (http://www.madr.ro/norme_de-eco-condiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html).

Respectați normele de lucru cu produse de protecția plantelor și pe cele de securitate și protecția muncii.

Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați.

IMPORTANT :

NOTA : ESTE INTERZISĂ PULVERIZAREA AERIEANĂ A PRODUSELOR DE PROTECȚIA PLANTELOR FĂRĂ AVIZUL OFICIULUI FITOSANITAR NEAMȚ CONFORM ORDONANȚEI DE URGENTĂ NR.34/2012, art.9.